



El ABC de los medicamentos

Qué debería saber sobre los antipsicóticos

La **psicosis de puede tratar**, y mucha gente se recupera bien, especialmente si reciben ayuda de manera precoz. Se puede recomendar el tratamiento ambulatorio o en el hospital. Generalmente consta de **medicamentos e intervenciones psicosociales**.

A menudo, los medicamentos denominados antipsicóticos son esenciales. Alivian los síntomas de la psicosis y pueden prevenir futuros episodios de la enfermedad.

LOS MEDICAMENTOS ANTIPSICÓTICOS PUEDEN VENIR EN DOS FORMAS: oral (pastillas) o inyectable (inyecciones mensuales). Hable con el equipo que lo trata para ver cuál es la mejor opción para usted.

Al igual que todos los medicamentos, los antipsicóticos pueden tener ciertos **EFFECTOS SECUNDARIOS**. Pueden ser los siguientes:

- Efecto de movimiento
- Sedación
- Aumento de peso o diabetes
- Mareos

El equipo que lo trata se comunicará con usted de forma regular para controlar esos efectos secundarios y ajustar los medicamentos según lo requiera.

Mi nombre:

Mis medicamentos:

¿Qué dudas tengo sobre los medicamentos?

LA PSICOSIS Y EL CEREBRO



Se cree que a la psicosis la causa, al menos en parte, un exceso de actividad de un químico del cerebro llamado “dopamina”. Demasiada dopamina causa algunos síntomas de psicosis, como alucinaciones (sentir cosas que no están ahí) y delirios (creencias falsas).

Los antipsicóticos funcionan bloqueando el efecto de la dopamina. Este bloqueo ayuda a que los síntomas de la psicosis sean menos abrumadores, pero no siempre los elimina por completo. Aun así, la gente puede escuchar voces y tener delirios, pero pueden reconocer mejor qué es real y enfocarse en otras cosas, como trabajar, ir a la escuela o enfocarse en la familia.

Hay ayuda a disposición.
Vaya a help4psychosis.ca para encontrar el programa local de Intervención Precoz en la Psicosis.

